

保健所への入院調整依頼の前に

1 「新型コロナウイルス感染症入院調整用患者連絡票（様式2-2）」使用上の留意点

新型コロナウイルス感染症入院調整用患者連絡票(様式2-2)は、新型コロナウイルス感染症の患者について、医師が他医療機関への入院調整を保健所に依頼する場合に使用するものです。

新型コロナウイルス感染症入院調整用患者連絡票(様式 2-2)を下記連絡先保健所に FAX し、併せて電話連絡をお願いします。(自医療機関に入院する場合や自医療機関において他医療機関への入院調整が可能な場合は、使用する必要はありません。)

入院可否については、令和5年4月7日長野県新型コロナウイルス感染症対策専門家懇談会において提案された「オミクロン株による COVID-19 の入院可否の判断目安」(下記参照)に基づいて判断してください。この目安に該当しない場合は、保健所が入院調整できない場合がありますので、ご了承ください。

- ※ 保健所による入院調整は、病院の入院調整の受入時間を考慮し、日中の時間帯(8:30～16:00)とします。(土日を含む)
- ※ 意識消失や呼吸困難等があり、緊急な処置が必要な場合は、時間帯にかかわらず、救急車を要請してください。

2 新型コロナウイルス感染症入院調整用患者連絡票送付時のチェック（提出不要）

	チェック項目	
1	保健所に電話連絡	
2	保健所に「新型コロナウイルス感染症入院調整用患者連絡票」を FAX 送信	
3	入院先決定後、診療情報提供書による連絡が可能	

3 その他

保健所が入院調整を行うと、医療機関が入院調整を行った場合に適用される診療報酬(950点)は算定できなくなります。

オミクロン株による COVID-19 の入院可否の判断目安

令和5年4月7日
長野県新型コロナウイルス感染症
対策専門家懇談会「入院目安」

1. 食べられない、ぐったりしているなど、全身状態の悪化
 2. 基礎疾患が悪化し、外来、往診先や高齢者施設等での対応が困難
 3. パルスオキシメータによる SpO₂ が 90%以下あるいは平常時より 5%以上の低下 (注)
- 注；SpO₂ は、脱水や寒冷で血流が低下したり、指の汚れやネイルアートなどの要因で誤差を生じます。
- 測定時は、脈波が十分に感知されていることを確認し、繰り返し測定することが重要です。発症直後は高熱による酸素消費量増加で SpO₂ が低下している可能性もありますので、重症感がなければ経過観察することをご検討ください。

連絡先保健所
(医療機関専用)

- *長野市以外にお住まいの方→長野保健福祉事務所 (Tel 225-9039 FAX 223-7669)
- *長野市にお住まいの方→長野市保健所 (Tel 226-9964 (休日 226-4911) FAX 226-9982)